

PREMIUM



# NEO BOOST

Για ένα δυναμικό ξεκίνημα



Το ΝΕΟΒΟΟST είναι ένα διατροφικό συμπλήρωμα σε μορφή γέλης που περιέχει γλυκερίνη, αμινοξέα, βιταμίνες και άλλα θρεπτικά συστατικά.

Είναι σχεδιασμένο για να ενισχύει την άμυνα του οργανισμού και να καλύπτει τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες των νεογέννητων και ελλιποβαρών χοιριδίων.

[www.nuvan.net](http://www.nuvan.net)



διαχείριση | γνώση | επίλυση

ΚΑΛΟΡΙΖΟΥ Μ.

Σ. ΚΟΥΡΟΥΠΙΔΗΣ Ε.Π.Ε

Ηρώων Πολυτεχνείου 65, Καρδίτσα, τηλ.: 24410 414951 [www.vkk.gr](http://www.vkk.gr)



Το  
NEOBOOST  
δίνει  
περισσότερη  
ενέργεια  
στα χοιρίδια

Πιο  
γρήγορος  
και έντονος  
δηλασμός

Πρόκληση  
αίσθησης  
πείνας

Κατανάλωση  
περισσότερου  
πρωτογάλακτος



Το NEOBOOST περιέχει:

✓ Γλυκερίνη που είναι εύγεστη, πλούσια σε ενέργεια, ταχύτατα απομοιώσιμη και δίνει άμεσα στα νεογέννητα χοιρίδια τη δύναμη που χρειάζονται για να δηλάσουν πρωτόγαλα.

✓ Αργινίνη και γλουταμινικό μονονάτριο ως ενισχυτικά της γεύσης και διεγερτικά της όρεξης, προκαλώντας έτσι τα χοιρίδια να πιούν περισσότερο πρωτόγαλα.

✓ Ένα ολοκληρωμένο σύμπλεγμα βιταμινών (A,D3,E), που βελτιώνουν τη φυσική κατάσταση των νεογέννητων χοιριδίων και αυξάνουν την ικανότητα δηλασμού. Ειδικά η βιταμίνη E βοηθάει στην αύξηση της αντοχής του οργανισμού στο stress.

## Υποθερμία

Η κύρια αιτία θνησιμότητας την πρώτη ημέρα της ζωής του χοιριδίου είναι η υποθερμία.

Η θερμοκρασία σώματος ενός ελλιποβαρούς χοιριδίου πέφτει ταχύτερα συγκριτικά με ένα μεγαλόσωμο χοιρίδιο, και γι' αυτό έχει λιγότερη δύναμη να δηλάσει.

Η χαμηλότερη πρόσληψη του ζεστού, πλούσιου σε ενέργεια πρωτογάλακτος επιτείνει την πτώση της θερμοκρασίας, καθιστώντας το χοιρίδιο ανίκανο να διατηρήσει το σώμα του ζεστό με αποτέλεσμα το θάνατό του.

Η βελτίωση της όρεξης και η ενέργεια που προσφέρει το NEOBOOST, χορηγούμενο τη σωστή στιγμή, δίνει στο χοιρίδιο αυτό που χρειάζεται για να επιβιώσει.

Το NEOBOOST είναι έτοιμο προς χρήση, εύκολο και απλό στο χειρισμό

## Χορήγηση

Χορηγούμε μία δόση 3ml σε κάθε νεογέννητο αδύνατο ή ελλιποβαρές (κάτω από 1 κιλό) χοιρίδιο όσο πιο γρήγορα γίνεται μετά τον τοκετό, και κατά προτίμηση τις πρώτες 4 ώρες, για να μπορέσει να πάρει τη μέγιστη δυνατή ποσότητα, πλούσιου σε θρεπτικά συστατικά και ανοσοσφαιρίνες, πρωτογάλακτος.

Η χορήγηση μπορεί να επαναληφθεί εντός του πρώτου 24ώρου της ζωής του χοιριδίου, στην περίπτωση που το χοιρίδιο είναι ακόμα αδύναμο.