

SeaLyt

Μειώνει τις πεπτικές διαταραχές, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε θειούχους πολυσακχαρίτες θαλάσσιας προέλευσης (καφέ φύκια – MSP) που διεγείρουν την παραγωγή και έκκριση βλεννίνης, ευνοώντας την προστασία του εντερικού βλεννογόνου μέσω της ενίσχυσης του στρώματος βλέννας του εντερικού επιθηλίου. Καλύτερα προστατευμένος ο εντερικός βλεννογόνος λειτουργεί αποτελεσματικότερα ως φραγμός αλλά και ρυθμιστής της απορρόφησης θρεπτικών συστατικών. Το SeaLyt προσφέρει, ακόμα, εύκολα αφομοιώσιμη ενέργεια, ρυθμίζει την κινητικότητα του εντέρου και ευνοεί την ενυδάτωση του ζώου.



Ενδείκνυται:

- Στην περίοδο του απογαλακτισμού
- Σε πεπτικές διαταραχές
- Κατά τη θερμική καταπόνηση

Δοσολογία - ενιαία εφαρμογή*(•)

SeaLyt Spark

- 1 ταμπλέτα των 87g / 1000 λίτρα νερό
- 1 ταμπλέτα των 45g / 500 λίτρα νερό
- 1 ταμπλέτα των 16g / 200 λίτρα νερό

Searup

Ενισχύει τη φυσική άμυνα χάρη στις ανοσορυθμιστικές ιδιότητες των θειούχων πολυσακχαριτών θαλάσσιας προέλευσης (καφέ φύκια – MSP), βιταμινών και αμινοξέων που ενεργοποιούν ειδικούς υποδοχείς του έμφυτου ανοσοποιητικού συστήματος. Εξαιτίας των συνεχών προκλήσεων που δέχεται το ανοσοποιητικό σύστημα (εμβολιασμοί, καταπόνηση, μυκοτοξίνες κ.α.) σε συνδυασμό με ένα, συνήθως, ανεπαρκές επίπεδο ανοσίας, τα νεαρά ζώα καθίστανται ευάλωτα σε μικροβιακές μολύνσεις, ενισχύοντας την ανάγκη αποτελεσματικότερης προστασίας και ανοσίας.

Ενδείκνυται :

- Για την υποστήριξη εμβολιακών προγραμμάτων
- Σε περιόδους καταπόνησης (απογαλακτισμός, μετακινήσεις – ανάμιξη ομάδων κλπ)

Δοσολογία - ενιαία εφαρμογή*(•)

Searup Spark

- 1 ταμπλέτα των 80g / 1000 λίτρα νερό
- 1 ταμπλέτα των 45g / 500 λίτρα νερό
- 1 ταμπλέτα των 16g / 200 λίτρα νερό

Searup Still

- 0,5 - 1 ml / λίτρο νερού ή 0,5 - 1 ml / 10 κιλά σωματικού βάρους

DigestSea

Η δυσλειτουργία της πεπτικής οδού (π.χ. στεάτωση, ηπατική συμφόρηση) ή των νεφρών, μειώνουν τις αποδόσεις και το προσδόκιμο ζωής των ζώων. Το DigestSea βελτιώνει την πεπτική λειτουργία, προστατεύει το ήπαρ, αυξάνει την έκκριση ενζύμων και σιέλου και βελτιώνει τη νεφρική λειτουργία, χάρη στις αντι-υπερλιπιδαιμικές ιδιότητες και τη διουρητική δράση των θειούχων πολυσακχαριτών θαλάσσιας προέλευσης (καφέ φύκια – MSP). Αποτελεί την ιδανική λύση σε περιπτώσεις δυσπεψίας και μειωμένης όρεξης, καθώς και για την πρόληψη του θερμικού και οξειδωτικού stress.

Ενδείκνυται :

- Σε περιόδους υψηλής παραγωγικότητας ή/και υψηλών μεταβολικών απαιτήσεων ή υψηλών θερμοκρασιών.

Δοσολογία - ενιαία εφαρμογή*(•)

DigestSea Still

- 0,3 - 1 ml / λίτρο νερού ή 0,3 – 1 ml / 10 κιλά σωματικού βάρους

Ecopiglet



Τα νεογέννητα χοιρίδια έρχονται πολύ νωρίς αντιμέτωπα με περιβαλλοντικές, διατροφικές, μικροβιακές αλλά και διαχειριστικές προκλήσεις. Για αυτό είναι επιτακτική η προετοιμασία της πεπτικής οδού των χοιριδίων για τον κίνδυνο βακτηριακών λοιμώξεων, τη μετάβαση από τη διατροφή με γάλα σε αποκλειστικά ξηρή τροφή και τις υψηλές απαιτήσεις ανάπτυξης και απόδοσης.

Διασφαλίζει την ακεραιότητα του εντερικού επιθηλίου και την αποτελεσματική πεπτική λειτουργία, χάρη στη βλεννίνη από θειούχους πολυσακχαρίτες θαλάσσιας προέλευσης (καφέ φύκια – MSP), **ευνοώντας την προστασία του εντερικού βλεννογόνου.**

Ενδείκνυται :

- Σε πεπτικές διαταραχές
- Σε προκλήσεις μέχρι και κατά τον απογαλακτισμό

Δοσολογία - ενιαία εφαρμογή*(•)

50g / τοκετομάδα (12 χοιρίδια) / ημέρα τις πρώτες 10-12 ημέρες

*συνιστώμενη ημερήσια δόση

Seagut Paste

Η φυσική λύση για τη διασφάλιση της πεπτικής υγείας των χοιριδίων!

Η διάρροια των νεογέννητων χοιριδίων μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας εάν δεν διαχειριστεί με τον κατάλληλο τρόπο, καθώς και στην κατάχρηση αντιβιοτικών, αυξάνοντας τον κίνδυνο ανάπτυξης αντιμικροβιακής αντοχής, μία από τις σοβαρότερες απειλές για την υγεία τόσο των ζώων όσο και των ανθρώπων.

Μοναδικός συνδυασμός τριών συνεργικών δράσεων που προλαμβάνει και θεραπεύει τη διάρροια των νεογέννητων χοιριδίων!

1. Προστατεύει τον γαστρεντερικό σωλήνα.
2. Ευνοεί μία ισορροπημένη μικροβιακή χλωρίδα.
3. Διατηρεί την ομοιότητα.

Διαιτητικό συμπλήρωμα χοιριδίων

Συνιστάται για την σταθεροποίηση της ισορροπίας νερού και ηλεκτρολυτών και την υποστήριξη της φυσιολογικής πέψης.

Οδηγίες χορήγησης:

Συνιστώμενη διάρκεια χορήγησης: 1 με 2 ημέρες.

Χορήγηση από το στόμα. Μία δόση (ένα «πάτημα» της αντλίας) των 2 ml / χοιρίδιο / ημέρα, για 1 με 2 ημέρες.

Χορηγείται σε περιπτώσεις κινδύνου εμφάνισης διάρροιας, κατά τη διάρκεια εμφάνισης διάρροιας ή ανάρρωσης από διάρροια.

