









ΚΑΛΟΡΙΖΟΥ Μ. – Σ. ΚΟΥΡΟΥΠΙΔΗΣ ΕΠΕ

Προϊόντα για χοιρίδια (πριν και μετά τον απογαλακτισμό)

Προϊόν	Τρόπος και διάρκεια χορήγησης
Tonistry Px	Από τη 2 ^η μέχρι την 9 ^η ημέρα, 500 ml διαλύματος Tonistry Px 3% την ημέρα ανά τοκετοομάδα. Συστήνεται και η χορήγησή του 1-2 ημέρες πριν τον απογαλακτισμό.
Uniferon	Εφάπαξ ενδομυϊκή χορήγηση την 3 ^η ημέρα, 1 ml ανά χοιρίδιο.
Seagut Paste	Χορηγείται σε περιπτώσεις κινδύνου εμφάνισης διάρροιας, κατά τη διάρκεια εμφάνισης διάρροιας ή ανάρρωσης από διάρροια. Χορήγηση από το στόμα. Μία δόση (ένα «πάτημα» της αντλίας) των 2 ml / χοιρίδιο / ημέρα, για 1 με 2 ημέρες.
Ecopiglet	Χρησιμοποιήστε το στις τοκετοομάδες όλων των πρωτόγεννων χοιρομητέρων ή σε περιπτώσεις εμφάνισης διάρροιας. Πριν την 5η ημέρα: 50 γρ/ημέρα/τοκετοομάδα σε μορφή σκόνης . Μετά την 5η ημέρα: σε μορφή σκόνης 50 γρ/ ημέρα / τοκετοομάδα (τουλάχιστον για 7 ημέρες). Ενιαίος τρόπος χορήγησης : από την 3 ^η μέχρι τη 12 ^η ημέρα.
Searup	Συνιστάται σε περιόδους καταπόνησης (απογαλακτισμός, μετακινήσεις, ανάμιξη ομάδων κλπ), πεπτικών διαταραχών και υποστήριξη εμβολιακών προγραμμάτων. 0,5 με 1 mL / λίτρο νερού / ημέρα ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης, ή για κάθε 10 κιλά ζώντος βάρους / ημέρα. Χρήση για 3 με 5 ημέρες, ειδικότερα τις τελευταίες 3 ημέρες πριν τον απογαλακτισμό.
Sealyt	Χορήγηση στην περίοδο του απογαλακτισμού, σε πεπτικές διαταραχές και σε περιόδους θερμικής καταπόνησης. Μία αναβράζουσα ταμπλέτα των 16 γρ. στα 200 λίτρα νερού για την πρόληψη και τον περιορισμό της διάρροιας και της αφυδάτωσης. Χορήγηση για 1 με 3 ημέρες ανάλογα με την κατάσταση των ζώων.
VKK Comfort	Πλήρης τροφή χοιριδίων. Χορηγείται από την 7 ^η ημέρα έως περίπου την 20 ^η .
VKK Grow	Πλήρης τροφή χοιριδίων . Χορηγείται από την 20 ^η ημέρα έως περίπου την 42 ^η .

Tonistry Px		{ 2 ^η μέχρι 9 ^η ημέρα & 27 ^η και 28 ^η ημέρα.
Uniferon		{ 3 ^η ημέρα.
Seagut paste		{ Σε περίπτωση διάρροιας 1 δόση για 1 ή 2 ημέρες.
Ecopiglet		{ 50 γρ/ημέρα/τοκετοομάδα, πριν την 5 ^η ημέρα ή για τουλάχιστον 7 ημέρες μετά τη 5 ^η ημέρα.
Searup		{ Χρήση για 3 ημέρες πριν τον απογαλακτισμό και 1-2 ημέρες πριν και μετά από εμβολιασμούς.
Sealyt		{ Χορήγηση στην περίοδο του απογαλακτισμού, σε πεπτικές διαταραχές και σε περιόδους θερμικής καταπόνησης για 1 με 3 ημέρες ανάλογα με την κατάσταση των ζώων.
VKK Comfort		{ Χορηγείται από την 7 ^η ημέρα έως περίπου την 20 ^η .
VKK Grow		{ Χορηγείται από την 20 ^η ημέρα έως περίπου την 42 ^η . Τις τελευταίες 5 ημέρες μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με το φύραμα απογαλακτισμού αλλά σε ξεχωριστές «ταϊστρος», οπότε και μετά γίνεται η πλήρης μετάβαση στο φύραμα απογαλακτισμού.